



Enskild motion

Motion till riksdagen

2007/08:m1040

ck

av Patrik Forslund (m)

Införande av prostatacancertest

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att landstingen skall erbjuda män regelbundna prostatacancertest.

Motivering

Antalet nya fall av prostatacancer har de senaste decennierna ökat markant i den industrialiserade världen, och sjukdomen är nu den vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 10 000 nya fall år 2005. De viktigaste orsakerna till denna ökning är dels att antalet äldre män i befolkningen har stigit, dels att de diagnostiska metoderna förbättrats. Risken för svenska män att drabbas av symptomgivande prostatacancer är omkring 10 %. Andelen män som får diagnosen prostatacancer är högre, detta beror på att dagens diagnosmetoder är så känsliga att vi upptäcker många små tumörer som aldrig skulle hinna utvecklas till sjukdom.

Möjligheterna att upptäcka tidig prostatacancer ökade väsentligt i början av 1990-talet då blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) infördes. Analys av PSA är numera till stor nytta, såväl vid utredning av misstänkt prostatacancer som vid uppföljning av patienter med sjukdomen. Lätt förhöjda PSA-värden förekommer emellertid även hos många män som inte har prostatacancer. Cancertumörer i prostatakörteln som upptäcks på grund av ett förhöjt PSA-värde hos symptomfria män är vanligen små, vilket ger goda utsikter till bot. Hälsoundersökning (screening) med PSA kan alltså förbättra möjligheten till bot för män som utvecklat prostatacancer. Vid tidig prostatacancer är prognosen mycket god och de allra flesta botas av den givna behandlingen.

Socialstyrelsen rekommenderar mammografi av kvinnor mellan 40 och 74 år. Landstingen erbjuder alla kvinnor mellan 50 och 69 år möjlighet att genomgå mammografiundersökning. I de flesta län erbjuds även ytterligare grupper mellan 40 och 74år undersökning. Själva undersökningen görs antingen i förebyggande syfte som en hälsokontroll eller på grund av att man känt förändringar i bröstet. Vid dessa hälsokontroller kan en brösttumör upptäckas innan den hunnit orsaka några symtom, eller innan den ens kan kännas i bröstet. För den enskilda kvinnan är det viktigt att veta att mammografi kan leda till tidigare upptäckt av bröstcancer. Då prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna är det rimligt att även män erbjuds regelbundna hälsokontroller av landstingen på samma sätt som kvinnor. Detta skulle göra det möjligt för fler män att tidigare upptäcka sjukdomen och behandla den.

Stockholm den 24 september 2007

Patrik Forslund (m)